

**Wie entwickelt sich ein großflächiges
farbiges Nachbild in Abhängigkeit von seinem Reiz?**

von

Wolf-Dieter Hickisch

aus

Goldap

Aus der Augenklinik
der Universität Erlangen-Nürnberg
Direktor: Professor Dr. E. Schreck

Wie entwickelt sich ein großflächiges farbiges Nachbild in Abhängigkeit von seinem Reiz?

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde
der Hohen Medizinischen Fakultät
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

vorgelegt

von

Wolf-Dieter Hickisch

aus

Goldap

Gedruckt mit Erlaubnis der Medizinischen

Fakultät Universität Erlangen-Nürnberg



Dekan: Prof.Dr.G.Koch

Referent: Priv.-Doz.Dr.E.Genée

Korreferent: Prof.Dr.E.Schreck

Tag der mündlichen Prüfung: 21. 3. 1972

Fragebogen

A) Name (Vater, Mutter, Kind)

B) Geburtsdatum

C) Wohnort

1.1 Beruf (Vater, Mutter, Kind)

1.2 Beruf (Vater, Mutter, Kind)

1.3 Beruf (Vater, Mutter, Kind)

1.4 Beruf (Vater, Mutter, Kind)

2.1 Meinen Eltern gewidmet

3.1 Name (Vater, Mutter, Kind)

3.2 Name (Vater, Mutter, Kind)

3.3 Name (Vater, Mutter, Kind)

3.4 Name (Vater, Mutter, Kind)

3.5 Name (Vater, Mutter, Kind)

4.1 Name (Vater, Mutter, Kind)

4.2 Name (Vater, Mutter, Kind)

4.3 Name (Vater, Mutter, Kind)



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41548610_0037

Inhaltsverzeichnis

A) Einleitung: Fragestellung

B) Hauptteil:

a) Literatur

1.) Definition des Nachbildes

2.) Phasen des Nachbildes

3.) Abhängigkeit des Nachbildes
von äußeren Faktoren

4.) Theorien der Entstehung von Nachbildern

b) Eigene Untersuchungen

1.) Versuchsaufbau

2.) Verwendete Geräte

3.) Eichung der Geräte

4.) Ergebnisse

C) Diskussion

D) Zusammenfassung

E) Literatur

A) Einleitung:

In den letzten Jahren ist es gelungen, großflächige homogen ausgeleuchtete Elektronenblitze zu entwickeln, die zu- meist in der Reproduktionsphotographie Verwendung finden. Aufgabe dieser Arbeit ist es nun, die subjektiven Nachbild-phasen nach farbigen, großflächigen, kurzen Lichtreizen besonders im Hinblick auf die Leuchtdichte des Reizes und die umgebende Helligkeit zu untersuchen.

B) Hauptteil:

a) Literatur

1.) Definition des Nachbildes

Ein Nachbild stellt eine subjektive Wahrnehmung dar, die noch andauert, wenn der physikalische, auf die Außenwelt zu beziehende Reiz bereits weggefallen ist.

2.) Phasen des Nachbildes

Nach einem kurzen Lichtreiz mittlerer Helligkeit beschrieben Purkinje (1868)

und Fröhlich (1921; Methode des bewegten Lichtreizes: Beobachtungen an einer im Kreise geschwungenen Kohle) die einzelnen Nachbildphasen und ihre zeitlichen Verhältnisse wie folgt:

Phase I

Das primäre Bild: Es ist mit dem Originalbild gleichzusetzen und intensitätsabhängig. Das primäre Bild ist außerdem von Farbe und Adaptionszustand abhängig.

Phase II

Erstes dunkles Intervall.

Phase III

Erstes positives, gleichgefärbtes Heringsches Nachbild. Es tritt 40-60msec nach Beginn des primären Bildes auf und dauert bei weißem Reizlicht 20-50msec. Dieses Nachbild ist bei höheren Lichtintensitäten sichtbar und bei farbigen Lichtreizen dem primären Bild gleichgefärbt. Ein roter Lichtreiz erzeugt kein Heringsches Nachbild.

Phase IV

Negatives Nachbild (Dunkles Intervall): Es ist intensitätsabhängig und dauert etwa 65-200msec.

Phase V

Zweites positives komplementär gefärbtes Purkinjesches Nachbild. Es hat eine Dauer von 60-200msec und ist etwa 170-250msec nach dem primären Bild sichtbar.

Phase VI

Negative Phase (Zweites dunkles Intervall länger dauernd als irgendeine der vorhergehenden Phasen ca. 500msec).

Phase VII

Eine längere, bei farbigen Lichtreizen gleichgefärbte positive Nachbildphase, das Heringsche Nachbild, dauert bis zu 5000msec.

Phase VIII

Ein langes spätes negatives Nachbild nach sehr hellen Lichtreizen, das meist komplementär gefärbt ist und einige Sekunden sichtbar sein kann.

3.) Abhängigkeit des Nachbildes von äußeren Faktoren

Der Verlauf der Nachbildphasen ist abhängig von der Dauer und Anstiegssteilheit des Lichtreizes. Bei mittlerer Intensität des Vorbildes ist nach längerer Fixierung desselben in den nächsten Sekunden nur noch das länger dauernde, negative, komplementär gefärbte Nachbild (Sukzessivkontrast) zu beobachten. Auch der Adaptationszustand beeinflusst die Dauer der Nachbildphasen. Unter skotopischen Bedingungen vergrößert sie sich deutlich. Während von Hess (1897) und auch Fröhlich (1922) fanden, daß der Nachbildverlauf für das zentrale und periphere Gesichtsfeld gleich seien, schreibt Pannevis (1947), daß periphere Nachbilder weniger intensiv sind und schneller verblassen.

Über die Entstehung der Nachbilder sind wiederholt Untersuchungen angestellt worden. Die Ansichten der Untersucher gehen noch immer erheblich auseinander. Helmholtz (1896) versuchte die Nachbilder und ihre Periodik durch Ermüdung und Aufmerksamkeitsschwankungen zu erklären, in dem er von der Betrachtung der nach länger dauernden Lichtreizen auftretenden Nachbilder ausging.

Hering (1909) glaubte an einen automatischen Ablauf der Nachbildphasen und ihre Unbeeinflussbarkeit durch willkürliche Vorgänge.

Dieser Auffassung schlossen sich die meisten Untersucher an. Die periodischen Nachbilder wurden von Ebbecke (1929) im Sinne antagonistischer Vorgänge mit einem retinalen und zentralen Anteil aufgefaßt.

Bayer (1926) erschien es am einleuchtendsten, die Periodik der Nachbildphasen in das Sehzentrum zu verlegen und den Wechsel gleichgefärbter und komplementärer Phasen mit dem Wechsel antagonistischer Erregungs- und Hemmungsprozesse in Zusammenhang zu bringen. Damit würden sich die Nachbildphasen den zahlreichen periodischen Reaktionen zwanglos einfügen, welche das ZNS vermittelt.

Cibis und Nothdurft (1948) erzeugten durch kräftigen Druck eines Fingers auf den Bulbus eine relative temporäre Amaurose, welche sie als Leitungsunterbrechung innerhalb der nervösen Substanz des Auges nachwiesen. Die Trennung in einen überwiegend retinal-peripheren und einen kürzeren zentralen Anteil des Nachbildes hielten sie für einwandfrei. Es sei grundsätzlich jede bewußte Wahrnehmung nur mittels zentraler Gehirnteile möglich. Der Nach-

weis eines rein retinalen Nachbildes, das durch die Vorbildeinwirkung auf das nicht sehende Auge ausgelöst wurde, zeige außerordentlich eindrucksvoll, daß in den Photoreceptoren die initialen photochemischen Prozesse trotz Druckamaurose stattfinden.

Grüßer und Grützner (1958) leiteten mit Hilfe von Mikroelektroden die Reaktionen einzelner retinaler Receptoren (Zapfen) der verschiedenen Neuronentypen der Retina und der optischen Cortex der Katze nach Lichtblitzen ab. Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, daß der primäre Entstehungsort der periodischen Nachbildphasen im retinalen Neuronensystem bestimmt werden muß. In der Retina beginne die rhythmische Aktivierung und Hemmung der Neurone nach einem Lichtblitz. Dieses primäre retinale Erregungsmuster sei die Grundlage für die folgenden corticalen Neuronenentladungen. Die Entstehung der periodischen Aktivierungsphasen der retinalen und corticalen Neurone wurde als Folge der Überlagerung von gleichzeitigen, synaptischen erregenden und hemmenden Impulsen interpretiert.

Brindley (1959) glaubte, auf Grund seiner Experimente sicher zu sein, daß die Nachbilder zumindest in ihrer frühen Phase durch photochemische Reak-

tionen in der Netzhaut bedingt sein müssen. Er stellte jedoch auch fest, daß dieselben nicht die einzige Ursache für Nachbilder seien.

Pannevis (1947) projizierte ein intensives Nachbild auf einen Hintergrund, dessen Helligkeit variiert und registriert werden konnte. Dabei folgte die Abnahme der Helligkeit der Potentialgleichung $H = t^a \cdot e^h$. Die den Lichtreiz überdauernde Regung verlief langsamer als die einleitenden physikalischen Prozesse und anders und schneller als die höheren nervösen Prozesse. Unter pathologischen Umständen ergab sich, daß bei Zentralskotom die Nachbildfunktion vollständig fehlte im Gebiet des Skotomes, das bedeutet, daß Nachbilder nicht hervorgerufen werden konnten. Mit der Restitution des Sehvermögens erschienen auch die Nachbilder wieder, und zwar mit einem peripheren Verlauf, der bei weitergehender Wiederherstellung zentralen Charakter annahm. Periphere Nachbilder waren nach gleichem Lichtreiz weniger intensiv und verblaßten schneller.

Fadgham (1963) konnte die Ergebnisse von Pannevis nicht bestätigen, kam jedoch auch zu dem Schluß,

daß signifikante quantitative Messungen über positive Nachbilder möglich sind, wenn Wright's Methode des beidäugigen Beobachtens angewendet wird. Die Helligkeitsempfindung eines Nachbildes in einem Auge wird binocular verglichen mit der Empfindung eines Vergleichslichtes in dem anderen Auge.

Cüppers (1956) führte die Nachbildmethode in die Schielbehandlung ein. Er entwickelte ein Ausblendverfahren zur Behandlung der Amblyopie.

Gibson (1937) hat festgestellt, daß Nachbilder Folge von Adaptationsvorgängen sind, die central und peripher ablaufen und von der Einwirkung des Reizes abhängig sind. Adaptation und negative Nachbilder sind nachgewiesen worden von Gibson (1937), Gibson und Radner (1937) und bestätigt worden von Vernon (1934) sowie Bales und Follansbee (1935).

4.) Theorien der Entstehung von Nachbildern

Die Köhler-Wallach-Theorie (1944) basiert auf der Übersättigung, einem angenommenen Prozeß wie sie in der Elektrophysik vorkommen, nämlich der Polarisierung von Elektrolyten. Auch die Köhler-Wallach-Theorie wurde von einigen Autoren angegriffen:

Erstens sei das physiologische Substrat für ihre Theorie noch unsicher, wie Lashley, Chow und Semmes (1951), Sperry und Meyers (1955) feststellten. Zweitens zeigen die Ergebnisse von Gibson und Radner (1937) sowie Sagara und Oyama (1957) ein der Adaptation ähnliches Phänomen, daß zur Stützung der Köhler-Wallach-Theorie versagt.

Osgood und Heyer (1952) akzeptierten die Theorie von Köhler und Wallach (1944), glaubten jedoch, daß noch neurologische Vorgänge eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Nachbilder spielen.

Durch Deutsch (1956) wurde nachgewiesen, daß die Osgood-Heyer-Theorie (1952) in ihrer gegenwärtigen Form nicht akzeptabel ist.

Durch seine Experimente ist Pollack (1963) über Gibsons (1937) Theorie der Adaptation zu einer ähnlichen Theorie gekommen, nämlich der sensorisch-tonischen Wahrnehmungstheorie als Ursache der Entstehung der Nachbilder. Er glaubt, daß sie die dem Phänomen der Nachbilder am meisten gerecht werdende Theorie ist. Er schloß aus seinen Experimenten auch, daß sie jedoch für die Nachbilder nur begrenzt anwendbar ist.

b) Eigene Untersuchungen

1.) Versuchsaufbau

Die Experimente wurden mit zwei normal-sichtigen, farbtüchtigen Personen durchgeführt, wobei einmal unter skotopischen Bedingungen (mindestens 30 Minuten Dunkeladaptation) und zum anderen bei einer Helligkeit von 100 Lux die Elektronenblitze beiden Augen der Versuchspersonen bei zentraler Fixation dargeboten wurden. Die Entfernung zum Blitzgerät wurde auf 0,50 m festgelegt, nachdem sich bei Probeversuchen herausgestellt hatte, daß bei näheren Entfernungen die gleichen Ergebnisse erzielt wurden. Um keine wesentlichen Abweichungen bei der Beurteilung der Farben durch die Versuchspersonen zu erhalten, wurden denselben vor und nach jeder Versuchsreihe Farbtafeln vorgelegt und eine Abstimmung der Farbtöne durchgeführt. Die Zeitangaben wurden mit Hilfe einer Stoppuhr festgelegt.

2.) Verwendete Geräte

Bei unseren Untersuchungen verwendeten wir einen Generator (der Firma Bron-Elektronik Basel), an den Flächenleuchten verschiedener Größe angeschlossen werden konnten. Bei den

beschriebenen Ergebnissen war die Fläche der Blitzleuchte 24 x 18 cm groß. Der Generator besaß sechs wählbare Stufen, deren Leistung 1000Ws, 750Ws, 500Ws, 375Ws, 250Ws und 125Ws betrugen.




Abbildung 1

Broncolor R 11 Generator
Elektrolytkondensatoren, Spannungs-
stabilisation, Leistungswahl durch
Drucktasten in logarithmischer Folge
im Verhältnis von 1:8, Ladungs-Anzeige-
lampe, Blitzauslösung durch Drucktaste,
Fernsteuerungssteckdose, Schloss-Be-
triebsschalter, in hellblaulackiertem
Stahlblechgehäuse
Nachladezeit: 1 bis 15 sec. je nach ge-
wählter Leistung
Anschlussmöglichkeit: Flächenleuchten
für Dias zu Vergrößerungsgeräten
Flächenleuchten für Dias zu Reprokameras
Flächenleuchten für Aufsichtsoriginale
Netzanschluss: 220 V, 3 A Einphasen-
Wechselstrom (andere Spannungen auf An-
frage)
Arbeitsspannung: 500 V
Masse: 550x390x370 mm
Gewicht: 26,8 kg




Abbildung 2

Flächenleuchte Typ LR 21/24 x 18 - D
zu Durst Laborator GR 184 und V 184
zum Einschub in Kondenseröffnung, aus-
gerüstet mit Flächenblitzröhren, Kalt-
Einstelllicht, Diffusorscheibe,
3 m Kabel in Stahlblechgehäuse mit
Lichtaustrittsöffnung 260 x 280 mm

3.) Eichung der Geräte

Die Leuchtdichte war bei allen Versuchen ent-
sprechend den Leistungsstufen 1123asb, 842asb,
562asb, 421asb, 281asb und 140asb. Die Eichung
der Lichtblitze mit Farbfiltern in allen vier
Farben geschah mit Hilfe der Photographie. Die
Dauer der Lichtblitze war während sämtlicher
Untersuchungen von einer konstanter Größe, sie
betrug $1/200\text{sec}$. Von jeder Farbe wurden jeweils
zehn Versuche durchgeführt und anschließend der
Mittelwert bestimmt.

4.) Ergebnisse

1. Nachbildphasen bei grünem Filter nach Dunkeladaptation Entfernung 0,50 m.

Stufe I	<u>Versuchsperson 1</u>					
Zeit in sec.	1	5	13	55	115	230
Farben des	weiß	hellgrün	violett	grün	dunkelgrün	-
Nachbildes						

	<u>Versuchsperson 2</u>					
	1	5	10	30	77	140
	weiß	hellgrün	violett	dunkelgrün	grün	-

Stufe II	<u>Versuchsperson 1</u>					
Zeit in sec.	1	9	12	42	25	30 270
Farben des	weiß	hellgrün	violett	grün	dunkelgrün	grau -
Nachbildes						

	<u>Versuchsperson 2</u>					
	1	5	65	95		
	weiß	violett	dunkelgrün	-		

Stufe III	<u>Versuchsperson 1</u>					
Zeit in sec.	1	4	45	115	350	
Farben des	weiß	hellgrün	violett	grau	-	
Nachbildes						

	<u>Versuchsperson 2</u>					
	1	8	55	123	177	
	weiß	violett	hellgrün	grau	-	

Stufe IV	<u>Versuchsperson 1</u>					
Zeit in sec.	1	4	57	250	300	335
Farben des	weiß	hellgrün	violett	dunkelgrün	grau	-
Nachbildes						

	<u>Versuchsperson 2</u>					
	1	5	45	150	168	
	weiß	violett	hellgrün	grau	-	

Stufe V
Zeit in sec.
Farben des
Nachbildes

Versuchsperson 1
1 3 63 277 350
weiß hellgrün violett grau -

Versuchsperson 2
1 5 55 185 195 260
weiß hellgrün violett grün grau -

Stufe VI
Zeit in sec.
Farben des
Nachbildes

Versuchsperson 1
1 2 73 265 387
weiß hellgrün violett grau -

Versuchsperson 2
1 10 62 280
weiß violett hellgrün -

2. Nachbildphasen bei grünem Filter
bei Beleuchtung von 100 Lux Ent-
fernung 0,50 m.

Stufe I
Zeit in sec.
Farben des
Nachbildes

Versuchsperson 1
1 5 15 20
weiß rot grau -

Versuchsperson 2
1 2 2 5
weiß rot grau -

Stufe II
Zeit in sec.
Farben des
Nachbildes

Versuchsperson 1
1 2 15 61
weiß violett grau -

Versuchsperson 2
1 2 30 37
weiß violett gelb -

Stufe III	Versuchsperson 1		
Zeit in sec.	<u>1 3 10</u>	43	118
Farben des	weiß hellgrün violett	grau	-
Nachbildes			

Versuchsperson 2
<u>1 7 25</u> 63 70
weiß violett gelb grau -

Stufe IV	Versuchsperson 1		
Zeit in sec.	<u>1 2 9</u>	78	90
Farben des	weiß hellgrün violett	grau	-
Nachbildes			

Versuchsperson 2
<u>1 3 23</u> 75 102
weiß hellgrün gelb grau -

Stufe V	Versuchsperson 1		
Zeit in sec.	<u>1 3 8</u>	55	150
Farben des	weiß hellgrün violett	grau	-
Nachbildes			

Versuchsperson 2
<u>1 4 17</u> 125
weiß hellgrün grau -

Stufe VI	Versuchsperson 1		
Zeit in sec.	<u>1 3 115</u>	245	
Farben des	weiß hellgrün	grau	-
Nachbildes			

Versuchsperson 2
<u>1 3 6</u> 105 175
weiß hellgrün blau grau -

1. Nachbildphasen bei blauem Filter
nach Dunkeladaptation Entfernung
0,50 m.

Stufe I
Zeit in sec.
Farben des
Nachbildes

Versuchsperson 1
1 4 50 80 205
weiß hellblau violett beige -

Versuchsperson 2
1 3 5 40 80 183
weiß hellblau violett blau grau -

Stufe II
Zeit in sec.
Farben des
Nachbildes

Versuchsperson 1
1 5 13 67 100 205
weiß hellblau violett blau beige -

Versuchsperson 2
1 2 5 7 80 350
weiß hellblau violett blau grau -

Stufe III
Zeit in sec.
Farben des
Nachbildes

Versuchsperson 1
1 6 117 135 275
weiß hellblau blau grau -

Versuchsperson 2
1 3 8 10 90 270 365
weiß hellblau blau violett blau grau -

Stufe IV
Zeit in sec.
Farben des
Nachbildes

Versuchsperson 1
1 4 13 118 240
weiß hellblau violett blau -

Versuchsperson 2
1 3 8 20 90 210 465
weiß hellblau blau violett blau grau -

Stufe V	<u>Versuchsperson 1</u>				
Zeit in sec.	1	3	65	190	235 255
Farben des	weiß hellblau violett blau grau -				
Nachbildes					

	<u>Versuchsperson 2</u>				
	1	3	7	35	105 300 400
	weiß hellblau blau violett blau grau -				

Stufe VI	<u>Versuchsperson 1</u>				
Zeit in sec.	1	5	18	140	210 270
Farben des	weiß hellblau violett blau grau -				
Nachbildes					

	<u>Versuchsperson 2</u>		
	1	3	8
	15 540		
	weiß hellblau blau grau -		

2. Nachbildphasen bei blauem Filter bei Beleuchtung von 100 Lux

Stufe I	<u>Versuchsperson 1</u>		
Zeit in sec.	1	3	8
Farben des	18		
Nachbildes	weiß blau violett -		

	<u>Versuchsperson 2</u>		
	1	3	14
	14		
	weiß hellblau -		

Stufe II	<u>Versuchsperson 1</u>			
Zeit in sec.	1	3	8	26 35
Farben des	weiß hellblau violett gelb -			
Nachbildes				

	<u>Versuchsperson 2</u>			
	1	3	10	30 75
	weiß hellblau violett gelb -			

Stufe III	<u>Versuchsperson 1</u>				
Zeit in sec.	1	3	8	25	145
Farben des	weiß	hellblau	violett	gelb	-
Nachbildes					

<u>Versuchsperson 2</u>					
1	3	5	7	45	105
weiß	hellblau	blau	violett	gelb	-

Stufe IV	<u>Versuchsperson 1</u>				
Zeit in sec.	1	4	12	85	180 285
Farben des	weiß	hellblau	violett	gelb	grau -
Nachbildes					

<u>Versuchsperson 2</u>					
1	3	7	110	220	245
weiß	hellblau	violett	gelb	grau	-

Stufe V	<u>Versuchsperson 1</u>				
Zeit in sec.	1	3	15	125	280 300
Farben des	weiß	hellblau	violett	gelb	grau -
Nachbildes					

<u>Versuchsperson 2</u>					
1	3	35	90	245	
weiß	hellblau	violett	gelb	-	

Stufe VI	<u>Versuchsperson 1</u>				
Zeit in sec.	1	3	15	125	280 350
Farben des	weiß	hellblau	violett	gelb	grau -
Nachbildes					

<u>Versuchsperson 2</u>					
1	3	35	90	245	
weiß	hellblau	violett	gelb	-	

1. Nachbildphasen bei rotem Filter
nach Dunkeladaptation Entfernung
0,50 m.

Stufe I	<u>Versuchsperson 1</u>			
Zeit in sec.	1	5	25	100 110
Farben des	weiß	hellblau	violett	grau -
Nachbildes				

<u>Versuchsperson 2</u>			
1	8	15	70 100
weiß	violett	grün	grau -

Stufe II	<u>Versuchsperson 1</u>			
Zeit in sec.	1	4	30	45 90
Farben des	weiß	violett	blau	grau -
Nachbildes				

<u>Versuchsperson 2</u>			
1	4	23	58 100
weiß	violett	grün	grau -

Stufe III	<u>Versuchsperson 1</u>			
Zeit in sec.	1	3	65	105 130
Farben des	weiß	violett	blau	grau -
Nachbildes				

<u>Versuchsperson 2</u>			
1	4	52	110 145
weiß	violett	grün	grau -

Stufe IV	<u>Versuchsperson 1</u>			
Zeit in sec.	1	5	110	150
Farben des	weiß	violett	grau	-
Nachbildes				

<u>Versuchsperson 2</u>			
1	5	85	105 165
weiß	hellblau	grün	grau -

Stufe V	<u>Versuchsperson 1</u>			
Zeit in sec.	1	8	35	80 200
Farben des	weiß	hellblau	grün	grau -
Nachbildes				

<u>Versuchsperson 2</u>			
1	7	20	80 225
weiß	hellblau	grün	grau -

Stufe VI	<u>Versuchsperson 1</u>		
Zeit in sec.	1	30	130 225
Farben des	weiß	grün	grau -
Nachbildes			

<u>Versuchsperson 2</u>		
1	20	115 205
weiß	grün	grau -

2. Nachbildphasen bei rotem Filter
bei Beleuchtung von 100 Lux.

Stufe I	<u>Versuchsperson 1</u>	
Zeit in sec.	1	10 15
Farben des	weiß	hellblau -
Nachbildes		

<u>Versuchsperson 2</u>	
1	15 25 30
weiß	hellblau violett -

Stufe II	<u>Versuchsperson 1</u>	
Zeit in sec.	1	4 35 50
Farben des	weiß	violett grün -
Nachbildes		

<u>Versuchsperson 2</u>	
1	5 10 59
weiß	violett grün -

Stufe III	<u>Versuchsperson 1</u>			
Zeit in sec.	1	5	17	59
Farben des	weiß	violett	grün	-
Nachbildes				

<u>Versuchsperson 2</u>				
1	5	10	60	
weiß	violett	grün	-	

Stufe IV	<u>Versuchsperson 1</u>				
Zeit in sec.	1	9	40	65	102
Farben des	weiß	violett	grün	grau	-
Nachbildes					

<u>Versuchsperson 2</u>				
1	10	25	60	
weiß	violett	grün	-	

Stufe V	<u>Versuchsperson 1</u>				
Zeit in sec.	1	5	45	133	177
Farben des	weiß	violett	braun	grau	-
Nachbildes					

<u>Versuchsperson 2</u>				
1	6	39	110	180
weiß	hellrot	braun	grau	-

Stufe VI	<u>Versuchsperson 1</u>				
Zeit in sec.	1	6	30	110	190
Farben des	weiß	blau	braun	grau	-
Nachbildes					

<u>Versuchsperson 2</u>				
1	10	43	145	200
weiß	hellrot	braun	grau	-

1. Nachbildphasen bei gelbem Filter
nach Dunkeladaptation Entfernung
0,50 m.

Stufe I
Zeit in sec.
Farben des
Nachbildes

Versuchsperson 1
1 5 10 40 72
weiß hellblau violett blau -

Versuchsperson 2
1 7 12 50 75
weiß hellblau violett blau -

Stufe II
Zeit in sec.
Farben des
Nachbildes

Versuchsperson 1
1 5 12 40 75 150
weiß hellblau violett blau grau -

Versuchsperson 2
1 7 35 80 140 170
weiß hellblau violett blau grau -

Stufe III
Zeit in sec.
Farben des
Nachbildes

Versuchsperson 1
1 5 55 100 150 160
weiß hellblau violett blau grau -

Versuchsperson 2
1 9 40 75 140 210
weiß hellblau violett blau grau -

Stufe IV
Zeit in sec.
Farben des
Nachbildes

Versuchsperson 1
1 4 70 115 170 220 225
weiß hellblau grün violett blau grau -

Versuchsperson 2
1 10 30 120 180 210
weiß hellblau grün blau grau -

Stufe V	<u>Versuchsperson 1</u>						
Zeit in sec.	1	4	31	70	115	180	190
Farben des	weiß	hellblau	grün	violett	blau	grau	-
Nachbildes							

<u>Versuchsperson 2</u>
1 7 33 130 180 200
weiß hellblau grün blau grau -

Stufe VI	<u>Versuchsperson 1</u>						
Zeit in sec.	1	4	35	80	145	195	210
Farben des	weiß	hellblau	grün	violett	blau	grau	-
Nachbildes							

<u>Versuchsperson 2</u>
1 10 34 126 173 230
weiß hellblau grün blau grau -

2. Nachbildphasen bei gelbem Filter
bei Beleuchtung von 100 Lux
Entfernung 0,50 m.

Stufe I	<u>Versuchsperson 1</u>			
Zeit in sec.	1	3	10	20
Farben des	weiß	hellblau	blau	-
Nachbildes				

<u>Versuchsperson 2</u>
1 3 15 40
weiß blau grau -

Stufe II	<u>Versuchsperson 1</u>						
Zeit in sec.	1	5	15	40	70	105	110
Farben des	weiß	hellblau	blau	violett	grün	grau	-
Nachbildes							

<u>Versuchsperson 2</u>
1 45 80
weiß grau -

Stufe III	<u>Versuchsperson 1</u>					
Zeit in sec.	1	10	65	75	110	130
Farben des	weiß	violett	blau	grün	grau	-
Nachbildes						

<u>Versuchsperson 2</u>
1 15 45 75 125
weiß violett blau grau -

Stufe IV	<u>Versuchsperson 1</u>					
Zeit in sec.	1	5	10	68	85	115 120
Farben des	weiß	hellblau	violett	blau	grün	grau -
Nachbildes						

<u>Versuchsperson 2</u>
1 25 65 115 170
weiß violett blau grau -

Stufe V	<u>Versuchsperson 1</u>			
Zeit in sec.	1	5	45	93 150
Farben des	weiß	hellblau	violett	blau -
Nachbildes				

<u>Versuchsperson 2</u>
1 8 85 145 200
weiß violett blau grau -

Stufe VI	<u>Versuchsperson 1</u>				
Zeit in sec.	1	4	25	60	100 140 176
Farben des	weiß	hellblau	grün	violett	blau grau -
Nachbildes					

<u>Versuchsperson 2</u>
1 7 102 145 180 250
weiß blau violett blau grau -

Die durchschnittliche Nachbilddauer betrug 199 sec.
 Aufgeteilt nach Dunkeladaptation und Helligkeit von 100 Lux

ergaben sich folgende durchschnittliche Werte für die Dauer der Nachbilder 225 bzw. 129 sec. Aufgeschlüsselt nach Farben und nach dem Zustand des Beobachterauges (bei 100 Lux und unter skotopischen Bedingungen) fanden sich folgende Durchschnittszeiten für die Dauer der Nachbilder

<u>Grün</u>	Dunkeladaptation:	258 sec.
	Helligkeit von 100 Lux:	108 sec.

<u>Blau</u>	Dunkeladaptation:	313 sec.
	Helligkeit von 100 Lux:	173 sec.

<u>Rot</u>	Dunkeladaptation:	154 sec.
	Helligkeit von 100 Lux:	98 sec.

<u>Gelb</u>	Dunkeladaptation:	175 sec.
	Helligkeit von 100 Lux:	131 sec.

Daraus ergibt sich die durchschnittliche Nachbilddauer für die einzelnen Farben

Grün: 183 sec.

Blau: 243 sec.

Rot: 126 sec.

Gelb: 153 sec.

Die durchschnittliche Nachbilddauer -nach der Reizstärke d.h. den einzelnen Leistungsstufen des Generators- betrug:

Stufe I	80 sec.
Stufe II	121 sec.
Stufe III	164 sec.
Stufe IV	196 sec.
Stufe V	225 sec.
Stufe VI	274 sec.

-  = weiß
-  = hellgrün
-  = violett
-  = grau
-  = dunkelgrün
-  = grün




Abbildung 3
Darstellung der Nachbildphasen der 1. Versuchsperson bei grünem Farbfilter
unter skotopischen Bedingungen in Kolonnen (Symbolerklärung obere Blattseite).

-  = weiß
-  = hellgrün
-  = violett
-  = grau
-  = dunkelgrün
-  = grün




Abbildung 4

Darstellung der Nachbildphasen der 2. Versuchsperson bei grünem Farbfilter unter skotopischen Bedingungen in Kolonnen (Symbolerklärung obere Blattseite).



Abbildung 5

Darstellung der Nachbildphasen der 1. Versuchsperson bei grünem Farbfilter und Beleuchtung von 100 Lux in Kolonnen (Symbolerklärung obere Blattseite).




Abbildung 6

Darstellung der Nachbildphasen der 2. Versuchsperson bei grünem Farbfilter und Beleuchtung von 100 Lux in Kolonnen (Symbolerklärung obere Blattseite).




Abbildung 7

Darstellung der Nachbildphasen der 1. Versuchsperson bei blauem FarbfILTER unter skotopischen Bedingungen in Kolonnen (Symbolerklärung obere Blattseite).




Abbildung 8

Darstellung der Nachbildphasen der 2. Versuchsperson bei blauem Farbfilter unter skotopischen Bedingungen in Kolonnen (Symbolerklärung obere Blattseite).

- ||||| = weiß
////// = hellblau
||||| = violett
==== = gelb
XXXXX = grau




Abbildung 9

Darstellung der Nachbildphasen der 1. Versuchsperson bei blauem Farbfilter und Beleuchtung von 100 Lux in Kolonnen (Symbolerklärung obere Blattseite).



Abbildung 10

Darstellung der Nachbildphasen der 2. Versuchsperson bei blauem Farbfilter und Beleuchtung von 100 Lux in kolonnen (Symbolerklärung obere Blattseite).



Abbildung 11

Darstellung der Nachbildphasen der 1. Versuchsperson bei rotem Farbfilter unter skotopischen Bedingungen in Kolonnen (Symbolerklärung obere Blattseite).




Abbildung 12

Darstellung der Nachbildphasen der 2. Versuchsperson bei rotem Farbfilter unter skotopischen Bedingungen in Kolonnen (Symbolerklärung obere Blattseite).




Abbildung 13

Darstellung der Nachbildphasen der 1. Versuchsperson bei rotem Farbfilter und Beleuchtung von 100 Lux in Kolonnen (Symbolerklärung obere Blattseite).



Abbildung 14

Darstellung der Nachbildphasen der 2. Versuchsperson bei rotem Farbfilter und Beleuchtung von 100 Lux in Kolonnen (Symbolerklärung obere Blattseite).





Abbildung 15

Darstellung der Nachbildphasen der 1. Versuchsperson bei gelbem Farbfilter unter skotopischen Bedingungen in Kolonnen (Symbolerklärung obere Blattseite).



Abbildung 16

Darstellung der Nachbildphasen der 2. Versuchsperson bei gelbem Farbfilter unter skotopischen Bedingungen in Kolonnen (Symbolerklärung obere Blattseite).



Abbildung 17

Darstellung der Nachbildphasen der 1. Versuchsperson bei gelbem Farbfilter und Beleuchtung von 100 Lux in Kolonnen (Symbolerklärung obere Blattseite).

-  = weiß
-  = hellblau
-  = blau
-  = violett
-  = grau



Abbildung 18

Darstellung der Nachbildphasen der 2. Versuchsperson bei gelbem Farbfilter und Beleuchtung von 100 Lux in Kolonnen (Symbolerklärung obere Blattseite).

C) Diskussion:

Bei unseren subjektiven Untersuchungen dürften wohl hauptsächlich die o.g. Phasen I., VII. und VIII. bei den Ergebnissen zu finden sein. Wobei noch zu bemerken ist, daß diese Phaseneinteilung nur Geltung für farblose kurze Lichtreize hat. Wenn der Lichtreiz coloriert ist, können wohl positive und negative Nachbilder wie bei einem mit weißem Lichtreiz hervorgerufenen beobachtet werden, aber einige davon sind farbig. Entweder sie sind von gleicher Farbe wie das Originalbild, dann werden sie homochromatisch genannt, oder sie sind in der Komplementärfarbe des Originals dann werden sie als komplementäre Nachbilder bezeichnet.

Von beiden Versuchspersonen (u.a. Verfasser) wurde schon nach den ersten Experimenten die übereinstimmende Angabe gemacht, daß sich beim Übergang von einer Nachbildphase in die andere, die Farben der Nachbilder unter skotopischen Bedingungen von der Peripherie des Bildes her ausbreiten würden. Bei 100 Lux Beleuchtung jedoch fand der Wechsel der Farben von der Mitte des Bildes her statt. Zieht man

die physiologischen Vorgänge in der Netzhaut bei Beleuchtung und bei Dunkelheit in Betracht (bei Helligkeit Zäpfchensehen, bei Dunkelheit Stäbchensehen) so dürfte diese Beobachtung dafür sprechen, daß es sich bei den Nachbildern tatsächlich um Folgen photochemischer Vorgänge handeln muß, wie Brindley mit Hilfe bunter Gitternetze als Originalbild bereits demonstrieren konnte. Daß die Reizstärke d.h. die Beleuchtungsstärke von großer Wichtigkeit für die Dauer der Nachbilder ist, wurde bei unseren Versuchen ebenso wieder bestätigt, wie die Tatsache, daß die Dauer der Nachbilder wesentlich länger ist, wenn skotopische Bedingungen herrschen, während sie bei Beleuchtung von erheblich kürzerer Dauer sind.

Auffällig war, daß in allen Nachbildphasen Violett als Übergangsfarbe auftrat. Im Zusammenhang mit der Einteilung in die einzelnen Nachbildphasen mußte diese Erscheinung so gedeutet werden, daß es sich um ein positives Nachbild handelt, das auch wesentlich durchscheinender in der Farbintensität war als alle anderen Nachbildfarben.

Am Ende aller Nachbildphasen fand sich der Eindruck "Grau". Diese Phase war zum Teil von kürzerer, zum Teil von längerer Dauer. Möglicherweise handelt es sich hierbei um eine Ermüdungsreaktion, die zur Folge hat, daß einfach nicht mehr gesehen wird, was jedoch als Eindruck "Grau" imponiert.

Unter skotopischen Bedingungen zeigt es sich, daß eine negative Nachbildphase bei grünen und blauen Farbfiltern von der gleichen Farbe war wie die des vorgesetzten Farbfilterns. Grün und Blau haben also als ein negatives Nachbild ein homochromatisches zur Folge. Bei rot und Gelb dagegen waren die negativen Nachbildphasen in der Gegenfarbe vorhanden, die bei additiver Mischung Weiß ergaben, so daß hier komplementäre Nachbilder vorliegen. Bei einer Beleuchtung von 100 lux waren bei allen vorgesetzten Farbfiltern ebenso komplementäre Nachbilder zu erkennen.

Die Beobachtung, daß bei den Farbfiltern Grün und Blau die Dauer der Nachbilder bei dunkeladaptierten Augen signifikant von längerer Dauer waren, war nicht Gegenstand dieser Untersuchungen. Ob ein direkter Zusammenhang zwischen längerer Dauer der Nachbilder bei Grün und Blau und der Homochromasie besteht, kann nicht sicher beurteilt werden. Während

Grün und Blau im unteren Bereich der Wellenlängenskala zu finden sind, haben Gelb und besonders Rot eine größere Wellenlänge. Möglicherweise bestehen Zusammenhänge zwischen Wellenlänge, Dauer der Nachbilder und Homochromasie bei den eben genannten Farben bei Dunkeladaptation. Eine Schlußfolgerung daraus wäre, daß Rot und Gelb in der Dunkelheit negative Nachbilder verursachen, weil sie von größerer Wellenlänge sind.

Abschließend kann gesagt werden, daß bei grünen und blauen Elektronenblitzen nach Dunkeladaptation negative homochromatische Nachbilder entstehen, während in allen anderen Fällen (Rot und Gelb bei Dunkeladaptation, alle vier Farben bei Beleuchtung von 100 Lux) komplementäre negative Nachbildphasen vorhanden sein müssen.

D) Zusammenfassung:

Da es in der Reproduktions-Photographie in den letzten Jahren homogen ausgeleuchtete, großflächige Elektronenblitze gibt, wurden dieselben zur Erzeugung von farbigen Nachbildern verwandt. An einen Generator, der in sechs verschiedenen Leistungsstufen, eine Beleuchtungsstärke von 1123 asb, 842 asb, 552 asb, 281 asb, 140 asb erreicht, wurde eine Flächenleuchte, der Elektronenblitz, von einer Fläche von 432 cm^2 angeschlossen und bei zentraler Fixation mit vorgesetzten Filtern in allen vier Farben beiden Augen von normalsichtigen, farbtüchtigen Versuchspersonen in einer Entfernung von 0,50 m dargeboten. Es wurden die einzelnen Nachbildphasen mit Hilfe der Stoppuhr subjektiv festgelegt. Die Ergebnisse zeigen, daß sich die Farben der Nachbilder bei Dunkeladaptation von der Peripherie des Bildes her entwickeln, während bei einer Beleuchtung von 100 Lux der Übergang in die nächste Nachbildphase vom Zentrum her geschieht. Während Grün und Blau bei Dunkeladaptation negative homochromatische Nachbilder zur Folge haben, finden sich bei Rot und Grün unter skotopischen Bedingungen sowie bei Beleuchtung von 100 Lux in allen vier Farben komplementäre negative Nachbilder.

E) Literatur:

1. Bales, J.F. and Follansbee, G.L., The after-effect of curved lines. J. exp. Psychol. 1935, 18, 499-503.
2. Bayer, L., Die periodischen Nachbilder nach kurzdauernder Belichtung mit farbigen Reizlichtern. Z. Biol. 85, 299-324, 1926.
3. Brindley, S., After images, J. Physiol. 147, 149-153, 1959.
4. Cibis, P., u. H. Nothdurft, Experimentelle Trennung eines zentralen und eines peripheren Anteils von unbunten Nachbildern. Lokalisation der Leitungsunterbrechung, die bei experimenteller Netzhautanämie zu temporärer Amaurose führt. Pflüg. Arch. ges. Physiol. 250, 501-520, 1948.
5. Conklin, J.E. The influence of figural inspection on visible movements: I. The figural after-effect. Northwest Science, 30, 77-97, 1956.
6. Conreur, MM.L., Meur, G., et Zahnen, A., Utilisation de stimuli colorés dans l'étude de l'adaptation locale précoce (note préliminaire). Bull. Soc. Belge d'Ophtal. 143, 542-547, 1966.
7. Crovitz, H.F. and Lipscomb, D.D., Dominance of the temporal visual fields. Amer. J. Psychol., 76, 631-637, 1963.
8. Cüppers, C., Ein Ausblendverfahren zur Amblyopiebehandlung, Klin. Mbl. Augenheilk. 128, 2, 236, 1956.
9. Cüppers, C., Moderne Schielbehandlung. Klin. Mbl. Augenheilk., 129, 5, 579-604, 1956.
10. Daw, N.W., Why after images are not seen in normal circumstances. Nature 23, 1143-1145, 1962.

11. Davson, M., Physiology of the eye (Philad.)
88, 1949.
12. Day, R.H., Pollack, R.H. and Seagram, G.N.
Figural after-effects: a critical
review. Austral.J.Psychol., 11,
15-45, 1959.
13. Deutsch, J.A., The statistical theory of figural
after-effects and acuity. Brit.J.
Psychol., 47, 208-215, 1956.
14. Duke-Elder, S., System of ophthal., Vol.IV 656,
London, 1968.
15. Ebbecke, U., Über spontane Nachbildschwankungen
und das Verhältnis von Nacherregung
und Induktion, Pflüg.Arch.ges.Physiol.
221, 198-214, 1929.
16. Ebbecke, U., Über positive und negative Nachbilder,
ihre gegenseitige Beziehung und den Ein-
fluß der lokalen Adaptation. Pflüg.Arch.
ges.Physiol. 221, 160-188, 1929.
17. Ekman, G. and Lindman, R., Note on measurement of
visual after-image intensity as a func-
tion of the time, Vision Res. 4, 579-584,
1964.
18. Fröhlich, F.W., Untersuchungen über periodische
Nachbilder. Z. Sinnesphysiol. 52, 60-88,
1921.
19. Fröhlich, F.W., Über den Einfluß der Hell- und
Dunkeladaptation auf den Verlauf der
periodischen Nachbilder. Z.Sinnesphysiol.
53, 79-107, 1922.
20. Gibson, R., Adaptation with negative after-effect,
Psychol. Rev., 44, 222, 223-244, 1937a.
21. Gibson, R., Adaptation, after-effect and contrast in
the perception of tilted lines: II.Si-
multaneous contrast and a real restriction
of the after-effect., J.exp.Psychol. 20,
553-569, 1937b.

22. Gibson, R. and Radner, M., Adaptation, after-effect and contrast in the perception of tilted lines: I. Quantitative studies. *J.exp.Psychol.*, 20, 453-467, 1937.
23. Grüsser, O.J., Reaktionen einzelner corticaler und retinaler Neurone der Katze auf Flimmerlicht und ihre Beziehung zur subjektiven Sinnesphysiologie. *Diss.Freiburg i.Br.*, 1956.
24. Grüsser, O.J., Rezeptorpotentiale einzelner retinaler Zapfen der Katze. *Naturwissenschaften* 44, 522, 1957.
25. Grüsser, O.J. und Grützner, A., *Neurophysiol. Grundlagen der periodischen Nachbildphasen nach kurzen Lichtblitzen.* *V.Graefes Archiv f. Ophthalm.*, Bd.160, S.65-93, 1958.
26. Grüsser, O.J. und Kapp, H., Reaktionen einzelner retinaler Neurone auf Lichtblitze. II. Doppelblitze mit wechselndem Blitzintervall. *Pflüg.Arch.ges.Physiol.* 266, 111-129, 1958.
27. Grüsser, O.J. und Rabelo, C., Reaktionen einzelner retinaler Neurone auf Lichtblitze. I. Einzelblitze und Lichtblitze wechselnder Frequenz. *Pflüg.Arch.ges.Physiol.* 265, 501-525, 1958.
28. Grützner, A.O.-J. Grüsser und Baumgartner, G., Reaktionen einzelner Neurone des optischen Cortex der Katze nach elektrischen Einzelreizen des Nervus opticus., *Arch. Psychiatr.Nervenkr.* 197, 1958.
29. Heinrich, F., Untersuchungen zum farbigen Simultan-contrast, *Optik*, 22, 162-168, 1965.
30. Helmholtz, H., *Physiologische Optik*, 2.Aufl. Berlin, 1896.
31. Hering, E., Eine Methode zur Beobachtung und Zeitbestimmung des ersten positiven Nachbildes kleiner bewegter Objekte. *Pflüg. Arch.ges.Physiol.* 126, 604-609, 1909.

32. Hess, C.v., Studien über Nachbilder. Albrecht v. Graefes Arch. Ophthal. 40, 259-279, 1894.
33. Hess., C.v., Experimentelle Untersuchungen über die Nachbilder bewegter leuchtender Punkte. Albrecht v. Graefes Arch. Ophthal. 44, 445-480, 1897.
34. Katz, M.S., Brief flash brightness, Vision Res. 4, 361-373, 1964.
35. Kinney, A.S., Effect of exposure time on induced color J. Opt. Soc. Amer. 55, 731-736, 1956.
36. Köhler, W., and Wallach, H., Figural after-effects, an investigation of visual processes. Proc. Amer. Philos. Soc., 88, 269-357, 1944.
37. Lashley, K.S., Chow, K.L. and Semmes, J., An examination of the electrical field theory of cerebral integration. Psychol. Rev. 58, 123-136, 1951.
38. Miller, N.D., Positive after image as a background luminance J. opt. Soc. Amer. 56, 1616-1620, 1966.
39. Nachmias, J. and Steinmann, R.M., Brightness and discriminability of light flashes, Vision Res. 5, 545-577, 1965.
40. Osgood, C.E. and Heyer, A.W., A new interpretation of figural after-effects. Psychol. Rev., 59, 98-118, 1952.
41. Padgham, C.A., Quantitative Study of visual after-images, Brit. J. Ophthal., 37, 165, 1953.
42. Padgham, C.A., The role of the retinal receptors in the formation of the positive visual after-image Vision Res. 3, 45-49, 1963.

43. Padgham, C.A., Measurements of the colour sequences in positive visual after-images, Vision Res.8, 939-949, 1968.
44. Pannevis, M., Über den Helligkeitsverlauf positiver Nachbilder, 113, 280-289, 1947.
45. Pollack, R.H., Application of the sensory-tonic theory of perception to figural after-effect, Acta Psychol., 21, 1-16, 1963.
46. Rehder, W.M., Vergleich der Detailerkennbarkeit des menschlichen Auges bei Kurzzeit u. Gleichlichtbeleuchtung, Biophysik, 2, 56-66, 1964.
47. Rein-Schneider, Physiologie des Menschen, Berlin, 1960.
48. Roman, C.V., The new physiology of vision XVI. Further studies of the retinal responses. Curr.Sci.34, 269-271, 1965.
49. Sagara, M. and Oyama, J., Experimental studies on figural after-effects in Japan. Psychol.Bull.54, 327-338, 1957.
50. Siebeck, R., Optik des menschlichen Auges, Berlin, 1960.
51. Sperry, R.W. and Meyers, R.E., Visual pattern perception following subpial slicing and tantalum wire implantation in the cortex. J.comp.physiol.Psychol., 48, 50-58, 1955.
52. Stabell, U. and Stabell, B., Color threshold measurements in scotopic vision I. Prestimulation varied, Scand. J.Psychol., 258-272, 1967.

53. Stabell, U. and Stabell, B., Color threshold measurements in scotopic vision
III. Simultaneous color contrast,
Scand.J.Psychol. 9, 133-137, 1968.
54. Vernon, M.D., The perception of inclined
lines. Brit.J.Psychol., 25, 186-196,
1934.
55. Walraven, P.L., and Leebeck, H.J., Phase shift
of sinusoidally alternating colored
stimuli, J.opt.Soc.Amer., 54, 78-82,
1964.
56. Wright, J.M.v., A note on interocular transfer
and the colour of visual after-images.
Scand.J.Psychol. 4, 241-244, 1963.
57. Wright, W.D., Researches on Normal and Defective
Colour Vision, 51-72, 1946, Kimpton,
London.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
F	F
G	G
H	H
I	I
J	J
K	K
L	L
M	M
N	N
O	O
P	P
Q	Q
R	R
S	S
T	T
U	U
V	V
W	W
X	X
Y	Y
Z	Z
[	[
\	\
]	]
_	_
`	`
a	a
b	b
c	c
d	d
e	e
f	f
g	g
h	h
i	i
j	j
k	k
l	l
m	m
n	n
o	o
p	p
q	q
r	r
s	s
t	t
u	u
v	v
w	w
x	x
y	y
z	z
{	{
}	}
~	~
!	!
@	@
#	#
\$	\$
%	%
&	&
'	'
(	(
)	)
*	*
+,-	+,-
=	=
<, >	<, >
?, !	?, !
"	"
^	^
™	™
–	–
—	—
‘	‘
’	’
“	“
”	”
„	„
‟	‟
†	†
‡	‡
•	•
‣	‣
․	․
‥	‥
…	…
‧	‧
 	 
 	 
‰	‰
‱	‱
′	′
″	″
‴	‴
‵	‵
‶	‶
‷	‷
‸	‸
‹	‹
›	›
※	※
‼	‼
‽	‽
‾	‾
‿	‿
⁀	⁀
⁁	⁁
⁂	⁂
⁃	⁃
⁄	⁄
⁅	⁅
⁆	⁆
⁇	⁇
⁈	⁈
⁉	⁉
⁊	⁊
⁋	⁋
⁌	⁌
⁍	⁍
⁎	⁎
⁏	⁏
⁐	⁐
⁑	⁑
⁒	⁒
⁓	⁓
⁔	⁔
⁕	⁕
⁖	⁖
⁗	⁗
⁘	⁘
⁙	⁙
⁚	⁚
⁛	⁛
⁜	⁜
⁝	⁝
⁞	⁞
 	 
⁠	⁠
⁡	⁡
⁢	⁢
⁣	⁣
⁤	⁤
⁥	⁥
⁦	⁦
⁧	⁧
⁨	⁨
⁩	⁩
⁪	⁪
⁫	⁫
⁬	⁬
⁭	⁭
⁮	⁮
⁯	⁯
⁰	⁰
ⁱ	ⁱ
⁲	⁲
⁳	⁳
⁴</	

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

σ_1^2 σ_2^2 σ_3^2 σ_4^2 σ_5^2 σ_6^2 σ_7^2 σ_8^2 σ_9^2 σ_{10}^2 σ_{11}^2 σ_{12}^2 σ_{13}^2 σ_{14}^2 σ_{15}^2 σ_{16}^2 σ_{17}^2 σ_{18}^2 σ_{19}^2 σ_{20}^2 σ_{21}^2 σ_{22}^2 σ_{23}^2 σ_{24}^2 σ_{25}^2 σ_{26}^2 σ_{27}^2 σ_{28}^2 σ_{29}^2 σ_{30}^2 σ_{31}^2 σ_{32}^2 σ_{33}^2 σ_{34}^2 σ_{35}^2 σ_{36}^2 σ_{37}^2 σ_{38}^2 σ_{39}^2 σ_{40}^2 σ_{41}^2 σ_{42}^2 σ_{43}^2 σ_{44}^2 σ_{45}^2 σ_{46}^2 σ_{47}^2 σ_{48}^2 σ_{49}^2 σ_{50}^2 σ_{51}^2 σ_{52}^2 σ_{53}^2 σ_{54}^2 σ_{55}^2 σ_{56}^2 σ_{57}^2 σ_{58}^2 σ_{59}^2 σ_{60}^2 σ_{61}^2 σ_{62}^2 σ_{63}^2 σ_{64}^2 σ_{65}^2 σ_{66}^2 σ_{67}^2 σ_{68}^2 σ_{69}^2 σ_{70}^2 σ_{71}^2 σ_{72}^2 σ_{73}^2 σ_{74}^2 σ_{75}^2 σ_{76}^2 σ_{77}^2 σ_{78}^2 σ_{79}^2 σ_{80}^2 σ_{81}^2 σ_{82}^2 σ_{83}^2 σ_{84}^2 σ_{85}^2 σ_{86}^2 σ_{87}^2 σ_{88}^2 σ_{89}^2 σ_{90}^2 σ_{91}^2 σ_{92}^2 σ_{93}^2 σ_{94}^2 σ_{95}^2 σ_{96}^2 σ_{97}^2 σ_{98}^2 σ_{99}^2 σ_{100}^2

sein werden sie.

Lebenslauf

Am 13.4.1939 wurde ich in Goldap/Ostpreußen als Sohn des Arztes Dr.med.Hans Hickisch und seiner Ehefrau Ingeborg, geb. Reichelt, geboren. Nach der Übersiedlung meiner Eltern nach Altenburg in Thüringen besuchte ich die Volksschule daselbst und anschließend die Oberschule. Im Jahre 1957 bestand ich das Abitur an der Goethe-Oberschule in Lützen im Spreewald. Nach meiner Flucht aus der sowjetischbesetzten Zone begann ich nach der Anerkennung meines Reifezeugnisses, wozu ein nochmaliger 1-jähriger Oberschulbesuch in West-Berlin erforderlich war, das Medizinstudium an der Freien Universität Berlin. Nach Bestehen des Vorphysikums (Freie Universität Berlin, 1960) und des Physikums (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 1963) legte ich im Jahre 1967 die Ärztliche Prüfung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mit "Gut" ab. Nachdem ich als Medizinal-Assistent im Kreiskrankenhaus Neustadt an der Waldnaab und in der Augenklinik der Städtischen Krankenhäusern Nürnberg tätig gewesen war, erhielt ich im Jahre 1969 die Approbation. Seit 1969 bin ich Assistenzarzt an der Augenklinik der Städtischen Krankenhäusern Nürnberg und befinde mich z.Zt. im 3.Jahr der Facharztweiterbildung.

Offsetdruck-Fotodruck

J. Hög, 8520 Erlangen Hauptstr. 109, (Nähe Martin-Luther-Platz) Tel. 22990